

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 11-6-70 070278

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél 5.17 - 9.57

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. F. DIJON 3405,12 k

25 Francs

Supplément n° 1 au bulletin n° 117 de Juin 1970.

9 JUIN 1970.

VIGNE

MILDIU : Les taches sont apparues en faible nombre comme prévu (5 Juin). Elles ont fleuri à la faveur des orages survenus en Bourgogne et Franche-Comté. Les vignes, protégées par le traitement avant le 5 Juin, devront être à nouveau traitées avant le 15 Juin. En Côte d'Or et Saône-et-Loire, il est préférable d'opérer après relevage. Dans les régions où les orages ne sont pas survenus, bien que le développement du mildiou soit entravé, renouveler le traitement à la suite du développement de la végétation (même date limite).

VERS DE LA GRAPPE : COCHYLIS - EUDEMIS : Les vignes non protégées, dans les climats habituellement sujets aux attaques de ces ravageurs, devront être traitées à l'aide d'un produit à action pénétrante (anciennement appelé curatif). L'insecticide est à ajouter à la bouillie antimildiou. Nous confirmons que le vol est d'importance moyenne à faible.

OIDIUM : Ajouter un produit antioïdium à la bouillie.

N.B. GRELE : En cas de grêle, effectuer un traitement dans les 24 heures, en vue de la cicatrisation des plaies.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POIRES : Les premières pontes ont été observées dans la nature depuis quelques jours et vont bientôt arriver à éclosion. Dans les situations les plus chaudes effectuer un premier traitement.

MOUCHE DE LA CERISE : Une première application est conseillée lorsque les premiers fruits commencent à se colorer sur les variétés habituellement contaminées (marmotte notamment). Une deuxième pulvérisation est à prévoir une dizaine de jours après la première.

Respecter strictement les délais d'emploi avant récolte:

- Dinéthoate, Formothion 7 Jours
- D.D.T., Diazinon, Fenthion, oléoparathions : 15 jours
- Endothon 21 jours.

RAPPEL : Oïdium du pommier, pucerons.

PETITS FRUITS

DESSECHEMENT DES TIGES ET ANTHRACNOSE DU FRAIBOISIER : Renouveler le traitement (suite au verso).

BETTERAVES

PEGOMYIES - PUCERONS : Rappel de la note du 29 Mai.

TEIGNE DE LA BETTERAVE : Peu nombreuses les jeunes chenilles se trouvent dans les feuilles du cœur des betteraves depuis les derniers jours de Mai. Il ne semble pas qu'un traitement soit nécessaire.

HOUELONS (4° traitement)

MILDIU : traiter immédiatement.

PUCERONS : Les premiers pucerons ailés se rencontrent sur les jeunes feuilles des extrémités des pousses. Surveiller l'apparition des colonies de pucerons et traiter si nécessaire.

P./3.06

.../...

PETITS FRUITS

OIDIUM DU CASSISSIER : Les conditions sont actuellement très favorables. Intervenir 15 jours après la première application.

CULTURES MARAICHERES

MILDIOU DE L'OIGNON : Les dernières précipitations orageuses sont favorables au développement de la maladie. Nous conseillons d'effectuer un premier traitement avec un produit organo-cuprique ou de synthèse, de préférence en atomisation.

SEPTORIOSE DU CELERI : Un premier traitement est conseillé avec un produit de synthèse.

Dernière note : Bulletin N° II7 de JUIN 1970.

Les Ingénieurs-Contrôleurs chargés des
avertissements agricoles :

Imprimerie de la Station de "Bourgogne et Franche-Comté". Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.